

एईडी (स्वचालित बाहरी डिफिब्रिलेटर)

1 एईडी को चालू करें।

2 एईडी पैड लगाएँ।
किसी भी कपड़े, आभूषण और चिकित्सा पैच को हटा दें जो भी पैड की प्लेसमेंट में हस्तक्षेप डाल सकता हो।
यदि छाती गीली है, तो त्वचा को सूखाएँ।
एक बच्चे या शिशु के लिए, बच्चे या शिशु के पैड का उपयोग करें या सुनिश्चित करें कि पैड 2.5 सेंटीमीटर (1 इंच) की आपसी दूरी पर हों। यदि आवश्यक हो तो एक को सामने की ओर (छाती पर) और एक को पीठ पर रखें।



3 एईडी के स्वचालित संकेतों का पालन करें।
यदि एईडी आपको ऐसा करने के लिए संकेत देता है, तो सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति को छू न रहा हो और बिजली का झटका दें।



4 छाती को दबाते हुए शुरू करके सीपीआर को जारी रखें।



इस पोस्टर की जानकारी औपचारिक प्राथमिक चिकित्सा और सीपीआर प्रशिक्षण की जगह नहीं लेती है।

अपने क्षेत्र में एक रेड क्रॉस फर्स्ट एड कोर्स का पता लगाने के लिए हमसे संपर्क करें और हमारी प्राथमिक चिकित्सा ऐप मुफ्त डाउनलोड करें:

myrc.redcross.ca | 1.877.356.3226 | redcross.ca/apps

